



Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

Web-Patient

Indhold

- Skema
- Beregning og opsummering
- Beregningsmetoder, noter
- Returnerede data til lægesystemet
- Validering af patientens indtastning
- Alarmgrænser
- WebReq links
- Udskrifter
- Referencer

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

Web-Patient

Skema

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Besked fra behandler:

Sæt kryds

Hvor stor en del af tiden har du de sidste 2 uger ...	Sæt kryds					
	Hele tiden	Det meste af tiden	Lidt over halvdelen af tiden	Lidt under halvdelen af tiden	Lidt af tiden	På intet tidspunkt
1 været nervøs, anspændt eller følt indre uro?	5	4	3	2	1	0
2 været meget bekymret over selv de mindste ting i din dagligdag?	5	4	3	2	1	0
3 været nødt til at undgå visse ting, steder eller aktiviteter, fordi de er angstprovokerende?	5	4	3	2	1	0
4 haft tilløb til angstanfald (panik)?	5	4	3	2	1	0
5 haft egentlige angstanfald (panikangst)?	5	4	3	2	1	0
6 haft gentagne ubehagelige tvangstanker, du ikke kan få ud af hovedet?	5	4	3	2	1	0
7 været nødt til at kontrollere alt, hvad du gør, eller gentage de samme handlinger igen og igen?	5	4	3	2	1	0
8 været meget genert, f.eks. når du spiser eller taler, mens andre ser på dig?	5	4	3	2	1	0
9 haft tilbagevendende tanker eller erindringer om en meget voldsom oplevelse?	5	4	3	2	1	0
10 haft svært ved at udføre dine daglige aktiviteter pga. disse symptomer?	5	4	3	2	1	0

Besked til behandler:

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

Web-Patient

↑ Beregning og opsummering

OPSUMMERING

Analysenavn	Værdi	Analysekode
ASS score;Pt(angst)	29	MCS88040

Noter:

ASS-tolkning	Patient	Referenceområde
1) ASS-totalscore:	25	0-50
2) Påvirkning af daglige funktioner:	4	< 3
3) Højeste score ved:	GAD, OCD	

Spørgsmål	Vurderer
1-2:	GAD (Generaliseret angst)
3:	Undvigelsesadfærd/Agarofobi
4-5:	Panikangst
6-7:	OCD (Tvangstanker og tvangshandlinger)
8:	Socialfobi
9:	PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion)
10:	Funktionsnedsættelse

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

Web-Patient

↑ Beregningsmetoder, noter

Tallene i felterne i skemaet skal ikke vises på hjemmesiden, kun bruges som hjælp i beregningerne nedenfor.

1. ASS-totalscore:
Alle skemaets angivelser summeres og angives som total-score.
Som referenceområde angives: 0-50.
2. Påvirkning af daglige funktioner:
Der angives scoren fra punkt 10.
Referenceområde: < 3.
Værdi på 3 og derover angives **røde**.
3. Højeste score ved:
Her angives *navnet* på den *gruppe* af angstsymptomer, der scorer højest, jvf. listen.
Dvs. der skal *ikke* først beregnes en sum indenfor en gruppe og derefter angives gruppe(r) med højeste sumscore, men blot navnet på de(n) gruppe(r), der indeholder et spørgsmål med den højeste score.
Der kan angives flere grupper separeret med et komma.
Eksempel: Hvis der scores således: spm 1: 3 - spm 2: **4** - spm 4: **4** - spm 5: 2 - spm 6: **4** - spm 8: **4** - skal der angives: **GAD, Panikangst, OCD, Socialfobi**.

↑ Returnede data til lægesystemet

Værdifelt:

Kode: MCS88040
Benævnelse, lang: Pt(angst)-Angst scoreskema; antal (værdi 0-50) = ?
Benævnelse, kort: ASS score;Pt(angst)
Værdi: **Ovennævnte ASS-score (0-50)**
Normalværdier: Ingen angives

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

Web-Patient

Resultatkommentar: (Ikke-proportional skrift)

ASS-tolkning	Patient	Referenceområde
ASS-totalscore:	25	0-50
Påvirkning af daglige funktioner:	4	< 3
Højeste score ved:	GAD, OCD	

Spørgsmål Vurderer

1-2:	GAD
3:	Undvigelsesadfærd/Agorafobi
4-5:	Panikangst
6-7:	OCD
8:	Socialfobi
9:	PTSD
10:	Funktionsnedsættelse

Rekvistionskommentar: (Ikke-proportional skrift)

Besked til lægen: Jeg var lidt ved siden af mig selv denne dag.

Patientens indtastninger er medsendt som bilag.

Metodeblad til skemaet: <https://goo.gl/??????>

Bemærk:

- Indskudt nye blanke linier og stiplede linier.
- Kolonneoverskrifter uden : (kolon) - Rækkeoverskrifter med : (kolon)
- Ingen mellemrum i intervaller: 1-2, 0-50 osv.
- Justering af kolonneoverskrifter og værdier med de blå streger som sigtelinier.
- Besked til lægen: Hvis der ikke er nogen besked til lægen, undlades denne linie helt. Max 170 tegn (3 linier) eller 240 tegn (4 linier).
- Metodeblad til skemaet: Hvis linket til metodebladet kan vises andetsteds i lægesystemets visning af laboratoriesvaret (Laboratorievejledning), undlades denne linie.

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

Web-Patient

Vedhæftet PDF-fil indeholdende de 2 hovedafsnit:

1) **OPSUMMERING**, som viser to afsnit (vist under afsnittet Beregning og opsummering):

- De returnerede analyser med tilhørende koder og værdier.
- Beregninger og opsummering vedrørende skemaet.

2) **PATIENTDATA:**

- Skema over patientens indtastede data.

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

Web-Patient

↑ Validering af patientens indtastning

1) Obligatoriske felter:

Startdato, alle felterne 1-10 skal have en angivelse markeret.

2) Ikke-obligatoriske felter:

Besked til behandler.

Hvad returneres, ved **manglende** udfyldelse?

1) Hvis de **obligatoriske** felter mangler:

Det skal ikke være muligt at sende skemaet.

2) Hvis **ikke-obligatoriske** felter mangler:

Værdi, opsummering og rådata sendes.

↑ Alarmgrænser

Kriterium: Ingen

Pop-up til patient:




Besked til patient:

Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS-skema)

Version: 06-11-2018

WebPatient

↑ WebReq links

- 1)  **Specialevejledning:** Link til vejledning fra DSAM eller andet SPECIALES officielle vejledning om skemaets brug eller den tilstand skemaet benyttes til.
DSAM: 'Angsttilstande, Diagnostik og behandling' -
<http://vejledninger.dsam.dk/angst/#>
- 2)  **Lægehåndbogen:** Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den tilstand, skemaet benyttes til.
Lægehåndbogen: 'Angst' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/symptomer-og-tegn/angst/>
- 3)  **Vejledning og skema:** Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

↑ Udskrifter

Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af:

- 1) lægen **ved bestilling** af prøven.
- 2) patienten via link i **mailen**.
- 3) patienten via link i **SMS'en**.
- 4) patienten fra **WebPatient**-siden.

↑ Referencer

- 1) DSAM: 'Angsttilstande, Diagnostik og behandling' -
<http://vejledninger.dsam.dk/angst/#>
- 2) DSAMs Angst-Symptom-Spørgeskema (ASS)' -
<http://vejledninger.dsam.dk/angst/?mode=visKapitel&cid=92&gotoChapter=95>
- 3) Lægehåndbogen: 'Angst' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/symptomer-og-tegn/angst/>
- 4) Lægehåndbogen: 'Tolkning af psykometrisk test ved angst' -
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/opslag-og-vaerktoejer/faglige-vejledninger/stress-angst-depression/angst/konsultationsvaerktoejer-om-angst/tolkning-af-psykometrisk-test-angst/>